



## INFORMARE DE PRESĂ

### Pesta porcină africană – evoluție în Europa – prevenire și măsuri de profilaxie nespecifică

În ultima perioadă serviciile veterinare din Ucraina semnaleză înmulțirea cazurilor de pestă porcină africană în zone care ridică gradul de alertă la nivel maxim. Săptămâna trecută au fost notificate cazuri de boală în regiunile Odessa și Mykolaiev.

În acest context epidemiologic cu evoluție în apropierea granzilor de est ale României se impune la nivel național sporirea măsurilor de profilaxie nespecifică.

Astfel considerăm necesară informarea crescătorilor de animale privind semnele clinice ale bolii și masurile pentru evitarea pătrunderii virusului pe teritoriul național:

▪ *Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?*

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.

- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înainte de moarte;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;

▪ *Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?*

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

▪ *Cum se transmite virusul?*

Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
- vectori biologici (căpușe din anumite specii care au parazitat anterior porci bolnavi);
- alți vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.

Sursele de virus includ și:

- sânge, țesuturi, secreții și excreții de la animalele bolnave sau moarte;
- animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat;
- mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulți ani.

### Responsabilitățile crescătorilor de suine – gospodăria populației - privind profilaxia pestei porcine africane :

- Este obligatorie monitorizarea zilnică a stării de sănătate a efectivului de porci și notificarea imediată a reprezentanților D.S.V.S.A. BACĂU în cazul suspiciunii bolii sau identificarea de porci morți în efective
- Este interzisă creșterea liberă a porcilor domestici în vecinătatea fondurilor de vanatoare, precum și pe suprafața gropilor de gunoieri și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți;
- Este interzis accesul porcilor domestici din gospodăriile populației în suprafața efectivă a Fondurilor de vanatoare

Responsabilitatile fermierilor privind profilaxia pestei porcine africane :

- Monitorizați strict măsurile de profilaxie și biosecuritate în exploatarea de porcine.
- Prin medicii veterinari de liberă practică care asigură servicii sanitare veterinare la nivelul fermelor de suine, efectuați examene clinice zilnice la efectivele de porci existente. În acest sens se vor întocmi Procese verbale de efectuare a examenelor clinice și consemnarea în Registrul de consultații și tratamente al fermei.
- Evitarea operațiilor de comerț intracomunitar / import cu teritoriile statelor aflate sub restricții privind pesta porcina africană și **respectarea procedurii prealabile de populare a fermelor de suine și de notificare a DSVSA BACAU;**

D.S.V.S.A. BACAU întreprinde următoarele măsuri:

- Organizează instruirii cu responsabilii fondurilor de vanatoare, cu medicii veterinari de liberă practică concesionari, cu personalul propriu, privind semnele clinice ale bolii, conduita în recoltarea probelor, măsurile nespecifice de profilaxie
- Informează operatorii economici privind evoluția Pestei Porcine Africane în spațiul intracomunitar și țări terțe, măsurile specifice de biosecuritate și responsabilitățile acestora privind desfasurarea operațiilor de comerț numai cu țări și state unde nu evoluează boala
- Multiplică și reafixează afișele conținând semnele clinice ale bolii, regulile de biosecuritate și conduita pe care trebuie să o aibă cetățenii la cele mai mici semne de suspiciune ale bolii.
- Distribuie pliantele informative referitoare la regulile de biosecuritate care trebuie respectate în timpul partidelor de vanatoare
- Reactualizează stocurile de materiale și responsabilizează structurile de intervenție
- Efectuează controale tematice pe tot lanțul alimentară, privind respectarea condițiilor de biosecuritate și de sănătate a animalelor în toate fermele porci și unitățile de abatorizare.
- Monitorizează strict operațiile de comerț intracomunitar / țări terțe cu porci vii, produse și subproduse de origine animală.

*Numărul de telefon al D.S.V.S.A. BACAU la care se primesc notificări despre eventualele suspiciuni de boala este 0234586233.*

**DIRECTOR EXECUTIV**

**PORTATOR DE CUVÂNT  
ALTĂ**